

NEUROCISTICERCOSE: QUANDO OPTAR PELO TRATAMENTO CIRÚRGICO?

Serrazina S R; Arbex L R; Coelho G P; Bastos W; Arbex MA

UniFOA – Centro Universitário de Volta Redonda, Volta Redonda, RJ.

Neurocisticercose é uma infecção do sistema nervoso central causada pela forma larvária da *Taenia solium*. É um grave problema de saúde pública nos países em desenvolvimento, devido à precariedade das condições sanitárias e baixo nível socioeconômico e cultural. Dar noções básicas ao estudante de medicina de como diagnosticar e conduzir um caso de neurocisticercose baseado em diretrizes e consensos publicados na literatura. Relato de caso de paciente do sexo feminino, V.R.L., 33 anos, com quadro de crises convulsivas tônico-clônicas generalizadas com aura visual e cefaléia refratária. Foi submetida à investigação clínica e complementar para esclarecimento diagnóstico. Foi diagnosticado neurocisticercose e procedeu-se a discussão sobre as possíveis condutas para o caso. O protocolo para o tratamento da NCC elaborado pelo Consenso de 2002 não aponta diretrizes para o tratamento cirúrgico da NCC parenquimatosa, portanto esta abordagem deve ser individualizada.

Palavras-chave: neurocisticercose; tratamento; convulsão.

Contato: suserrazina@yahoo.com.br